

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Medencetörések

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

- Fektetés, fájdalomcsillapítás, irányított mobilizáció.
- Húzókezelés-helyi érzéstelenítésben, combcsonton vagy lábszárcsonton átvezetett dróton keresztül húzókészülék alkalmazásával kezelés időtartama: 3-6 hét (ezen idő háton fekvés).
- Műtéti kezelés – elülső hasfalon keresztül vagy keresztcsonti tájon behatolva fémlemezzel, csavarokkal, a törés pontos helyreállítása, stabilizálása, ficamok megszüntetése.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja fájdalomcsillapítás, elmozdulások és ficamok megszüntetése, lehetséges másodlagos elmozdulások megakadályozása, medence stabilizálás, ízületi egyenetlenség megszüntetése, mielőbbi járóképesség helyreállítása.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

- Fektetés, húzókezelés tartama alatt felfekvés, tüdőgyulladás, thrombosis, embolia – ezek idősebb korban végzetesek is lehetnek. Természetesen alkalmazunk vérhígító injekciókat/Heparin származékok – de ezek a fenti szövődmények lehetőségét ki nem zárják, csak az előfordulás valószínűségét csökkentik.
- Befűrés helyén helyi sebgyulladás.
- Műtét esetén – lehetséges altatási/érezéstelenítési szövődmények - lásd külön beleegyző lapon.
- Általános műtéti szövődmények – vérzés, ér, ideg sérülés, sebfertőzés, thrombosis, embolia.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

A fenti kezelési módok egyben egymás alternatíváit is képezik.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

A törés nem megfelelő helyzetben gyógyul, a járásképeség károsodhat. Amennyiben ízületi egyenetlenség marad vissza az ízület kopása felgyorsul, ami fájdalommal, mozgás beszűkülésével jár.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A kezelés sikere orvosi szempontból a törés mielőbbi stabilizálása, a lehetséges korai és késői szövődmények elkerülése, a beteg normál életvitelének minél korábbi helyreállítása.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Konzervatív kezelés esetén elmozdulás nélküli töréssel a 3-5. napon részterheléssel a sérültek mobilizálhatók. 6 hét után a terhelés fokozható. Legkésőbb a 3 hónappal a sérülés után teljes terhelés javasolt.

Műtéti kezelés esetén a műtét utáni 3. napon részterheléssel mobilizációt kezdünk. Egyszerű törés utáni 8. hét után, komplikált, illetve a terhelési zónát is érintő törések esetén 12. hét után javasolt a teljes terhelés.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása