



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Beteg neve: #!NEV; TAJ száma: #!TAJ; Születési dátuma: #!SZULIDO;

A MÉH JÓINDULATÚ DAGANATÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA A beavatkozás orvosi megnevezése: Myoma enucleatio

Miért történik a műtét

Az eljárás célja, hogy a méh izomzatában keletkezett jóindulatú daganatot (idegen szóval: myoma) kimetsszék, a méh eltávolítása nélkül. A műtét azért szükséges, mert a daganat menstruációkor elhúzódó vérzést, komoly fájdalmat okozhat, a nagy méretű elváltozás pedig megakadályozhatja terhesség létrejöttét.

Konzervatív kezelés, a beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei

A méhizom jóindulatú daganatai a klimax kapcsán, a hormonális változások miatt visszafejlődhetnek, ezért némely esetben nem szükséges sebészi beavatkozás. Amennyiben azonban Önnek panaszai vannak, és szeretne még gyermeket vállalni, a műtetre szükség van.

Mi a teendő műtét előtt

Kezelőorvosa személyesen megbeszéli Önnel az okot, amely szükségessé teszi a beavatkozást. Tájékoztatja Önt a kezelés valamennyi lehetőségéről, valamint arról, pontosan melyik típusú műtétet tartja a leghatékonyabbnak az Ön esetében. A kapott információ alapján Ön aláírja a beleegyező nyilatkozatot; enélkül nem kerülhet sor a műtetre. Fontos, hogy orvosa utasítása szerinti időponttól ne fogyasszon ételt és italt. Feltétlenül jelezze az altatóorvosnak, milyen gyógyszereket szed, van-e gyógyszerallergiája.

Hogyan történik a műtét

A műtétet általános érzéstelenítésben, altatás mellett végzik. A hasi feltárás után a méhet speciális fogóval előemelik. A méhizom jóindulatú daganatos elváltozásai fallal rendelkeznek, jól körülhatároltak. A sebész ezért a daganatra rámetesz, és mintegy kihámozza a falából. Ezt követően felszívódó fonállal összevarrja a falat.

Mi a teendő műtét után

Minél hamarabb kezdjen mozogni, s jóval korábban keljen fel annál, mint erre késznek érezné magát. A mozgás talán fájdalommal jár, mégis a mihamarabbi felépüléséhez elengedhetetlen. Gyógyulását komolyan befolyásolhatja saját hozzáállása is. Kezelőorvosa utasításait a műtétet követően is tartsa be. Bármilyen elváltozást tapasztal műtét hétenél (melegség, duzzanat, váladékozás) azonnal szóljon orvosának.

Melyek a műtét veszélyei

Az orvostudomány mai állása szerint egy sebészi beavatkozás abszolút veszélytelenségét és a műtét teljes sikerét egyetlen orvos sem garantálhatja.

- Erős vérzés: amely vérátömlesztést igényel. A vérátömlesztés nagyon ritkán fertőzést /pl. hepatitis, májgyulladás/ okozhat.
- Környező szervek sérülése: /pl. húgyvezeték, húgyhólyag, belek/. Ennek veszélye minden esetben nagyobb, amikor gyulladások, daganatok vagy előzetes műtétek összenövésai folytán az anatómiai helyzet eltér a szokásostól. Ilyen komplikáció esetén társszakmák bevonására is sor kerülhet: sebész, urológus egészítheti ki a műtétit csapatot, a sérülések szakszerű ellátása érdekében.
- Idegek kompressziós sérülése: általában időleges, pár hét alatt a tünetek megszűnnek. Ezek általában hosszabb műtétek esetén a műtétasztalon való fekvésből adódnak, fő tünete az adott testrésztelre vonatkozó érzékszavar, mozgáshiány.
- A vizeletürítés zavara: általában rövid ideig tart, katéter visszahelyezésével 1-5 nap alatt rendeződik.
- Utóvérzések: esetleg több nappal a műtét után : újabb műtétet ill. vérátömlesztést igényelhet.

- Hasi, háti , mellkasi fájdalom: általában beavatkozás nélkül, maguktól megszűnnek.
- Túlérzékenység: a kapott gyógyszerekre, fertőtlenítőszerre.
- Gyulladás: a műtéti területen vagy a hasfalban: ezek a gyulladások antibiotikum kezelésre általában pár nap alatt teljesen megszűnnek. A hasfali gyulladások / tüneti: fájdalom, bőrpír, váladékozás, a hasfal egyes rétegeinek, ritkán teljes egészének szétválása: ez általában localis sebkezelést de az esetek egy részben újabb hasfalzáró műtétet igényel.
- Tályog illetve fistula a környező szerveken: igen ritka szövődmények, általában műtéti beavatkozást igényelnek.
- Gyógyszer bevételekor félrenyelés, fuldoklás, sürgős műszeres gégeszeti beavatkozás válhat szükségessé. Ritkán allergiás reakciók, bőrtelenségek jelentkezhetnek.
- Izomba adott injekciók, infúziós kezelés: véna gyulladása, vérrögösödése (trombózis), tartós gyulladás jelentkezhet, ennek szövődménye embolia is lehet. Az infúziós folyadék a véna sérülése során a szövetek közé kerülhet, gyulladást, elhalást, hegesedést, a végtag tartós, vagy maradandó károsodását okozhatja.
- Vérátömlesztés: súlyos allergiás reakciót, életveszélyes keringés és veseműködés romlást, nehezen vagy egyáltalán nem gyógyítható vírusfertőzést (pl. HIV, krónikus májgyulladások) okozhat.

Melyek a műtét előnyei

A beavatkozás előnye, hogy a mióma eltávolításával megszűnnek korábbi panaszai.

A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:

.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

Hozzájárulok, hogy ellátásom során az intézetben tanuló nővérek, orvostanhallgatók, rezidensek jelen legyenek.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, #!AKTDATUM;

.....

orvos aláírása
aláírása

.....

beteg (törvényes képviselő)