



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

010610401 Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Dr. Végh György Ph.D.

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458-4592 Internet: www.janoskorhaz.hu

MARSUPIALIZÁCIÓ

(A Bartholin mirigy tályogának műtéte)

TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT ORVOSI KEZELÉSHEZ ÉS BEAVATKOZÁSHOZ

A beteg neve:.....TAJszáma:.....

Tisztelt Betegünk!

Önnök érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottsága alapján döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásról. Tájékoztatjuk róla, hogy ahhoz, hogy az Önnél tervezett beavatkozást elvégezhessek írásos beleegyezése szükséges. Kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót és amennyiben hozzájárul a beavatkozás elvégzéséhez olvasható aláírásával ezt erősítse meg!

A beavatkozást végző osztály: Szülészeti-Nőgyógyászat

A beavatkozást végző orvos:.....

A tervezett beavatkozás neve latinul: Marsupialisatio

A tervezett beavatkozás neve magyarul: marsupializáció (Bartholin mirigy tályogjának műtéte)

A tervezett beavatkozás ismertetése, célja, technikája:

A Bartholin mirigy a hüvelybemenetnél, a nagyajak alsó harmadában helyezkedik el. Váladéka hozzájárul a hüvely nyálkahártyájának síkosságához. Kialakulhatnak benne folyadékkal telt elváltozások (pl.cysták), melyek felülfertőződése tályog kialakulásához vezethet, mely gyulladással, fájdalommal, lázas állapottal járhat.

A beavatkozás célja: A gyulladt Bartholin mirigy megnyitása, gennyes bennének kiürítése, a tályogüreg fertőtlenítő oldattal történő átöblítése, szükség esetén drainálása.

A beavatkozás technikája: A beavatkozás rövid, vénás altatásban történik, a műtét során fájdalmat nem fog érezni. A szeméremtest fertőtlenítését követően egy hosszanti bemetszést ejtünk a nagyajak és a hüvelybemenet belső oldalán, így a mirigy tartalmát kiürítjük. Ezt követően a tályog üregét fertőtlenítő szerrel átöblítjük (amennyiben a betegnek nincsen jóérzékenysége Betadinos oldattal)A sebszélek összetapadásának megelőzése érdekében, illetve azért, hogy az esetleges kiújulást megakadályozzuk a sebszéleket kiöltjük, szükség esetén a tályogüregben draint, vagy gézcsíkot hagyunk bent másnap reggelig. A varratok felszívódnak, így azok eltávolítása a későbbiekben nem szükséges.

A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:Mint minden műtéti beavatkozásnak a marsupialisationak is lehetnek különböző szövődményei. A műtéti terület felülfertőződése, utóvérzés, újabb tályog kialakulása, esetleges thrombosis felléphet a beavatkozást követően, bár ezen szövődmények valószínűsége nagyon ritkán fordul elő.

A fent említett szövődmények esetleges fennállásakor a seb megnyitása, varratok eltávolítása, sebüreg öblögetése, antibiotikum, illetve alvadésgátló injekció (LMWH kezelés) alkalmazása válhat szükségessé.

Sebgyógyulási zavarok, illetve egyéni tulajdonságok miatt kóros hegesezés léphet fel (pl keloid). Emiatt a heg újbóli kimetszése is felmerülhet.

Reméljük tájékoztatónkkal valamennyi felmerülő kérdésére választ kapott, amennyiben további információra szorul, kezelőorvosával alkalma lesz műtét előtt további konzultációra.

8. A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:

.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszerstől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosiilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása